



# Välkommen till endoskopimottagningen USÖ

**Anmälan:** Anmäl dig vid informationsdisken på entréplan vid entré B 15 minuter innan planerad undersökning. Du kan använda självcheckning.

**Gå till:** Entré B, ta hiss B1 till våning 1 och sätt dig i väntrummet.

**Besöket avser:** Sigmoidoskopi, vilket innebär bedömning av din tjocktarm. Du får besked om eventuella fynd i samband med undersökningen. Läkaren som skickade remissen ansvarar dock för helhetsbedömningen av dina symtom.

Det är svårt att bedöma med säkerhet hur lång tid det tar vid våra undersökningar beroende på vad man hittar. Detta gör att väntetid kan uppstå på mottagningen. Anhöriga hänvisas till väntrummet.

**Förberedelser:** Tag ett Klyxlavemang kvällen före samt på undersökningens morgon. Klyx finns att köpa på apoteket. Mat och dryck får intas som vanligt.

Om du äter järntabletter måste du göra uppehåll med dem 7 dagar före undersökning.

Du får inte köra bil på undersökningens dag på grund av de läkemedel som kan ges i samband med undersökningen.

**Det här gäller om du behandlas med följande läkemedel:**

- Waran - remiss är skickad för nedtrappning. Kontakta din AK-mottagning.
- Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana - gör uppehåll 2 dagar innan undersökningen.
- Plavix/Clopidogrel, Prasugrel, Brilique, Efixent - gör uppehåll 7 dagar innan undersökningen.
- Trombyl/Acetylsalicylsyra kan du fortsätta med som vanligt.

**Gör inte uppehåll med medicinen om du:**

- har njursvikt
  - har en mekanisk hjärklaff
-

- har genomgått kranskärlsröntgen med ballongsprängning senaste året
- har fått behandlingen för blodproppar senaste tre månaderna

Kontakta din ordinarie läkare eller AK-mottagningen för att diskutera hur du ska göra.

Övriga mediciner kan du ta som vanligt, även på morgonen inför undersökningen.

**Tolk:** Behövs tolk, kontakta oss snarast.

**Undvik starka dofter:** Många blir sjuka av starka dofter. Undvik parfymer, deodorant eller tvål som luktar starkt